



Cikkszám: 987958-10, 550 ml, 987958-20, 600 ml

Tőgyfertőtlenítő spray a tőgybimbó fertőtlenítésére

A DeLaval ergonomikus tőgyfertőtlenítő spray kényelmes, egyszerű és takarékos; előrelépést jelent a masztitisz elleni védekezésben, és a tőgyegészség javításában.

Az 550 ml-es spray (cikkszám: 987958-10) - egy külön rendelhető tartó (cikkszám: 968066-51) segítségével - a ruhára akasztható.

A 600 ml-es tőgyfertőtlenítő spray (cikkszám: 987058-20) széles palackja tartó nélkül is stabilan áll.

Előnyei:

- A szöget bezáró fúvóka egyenletesen eloszlatja a tőgyfertőtlenítő szert a tőgybimbón, hatékony védelmet nyújtva ezzel a masztitiszfertőzés ellen.
- A rozsdamentes acél szórófej tartós, egyenletes szórásképet ad.
- Könnyen kipumpálható a palackban lévő tőgyfertőtlenítő szer.
- Súlya kicsi.

Karbantartás:

- Rendszeresen vagy szükség esetén öblítse el a pumpát és a szórófejet meleg vízzel.

Fejés utáni tőgyhigiénia

Masztitisz

A masztitist, vagy másnéven tőgygyulladást nagyon sokféle baktérium okozhatja. Ezek a baktériumok általában mindenütt jelen vannak. Közvetlenül fejés után - amikor a tőgybimbócsatorna még nyitva van - könnyen a tőgybe juthatnak.

Bimbófüröszttel vagy tőgyfertőtlenítő spray használatával a baktériumok elpusztíthatóak, s a bimbócsatorna megvédhető a kórokozók szemben.

Azon kívül, hogy csökken a tejtermelés, a masztitisz klinikai és szubklinikai (látható tünetek nélküli) formában is jelentkezhet. Jelenlegi becslések szerint a tehenek kb. 20%-a szenved masztitiszben, és még többnek lehet szubklinikai masztitisz, akár az állomány 50-60 %-ának is. Ha a betegség klinikai formát ölt, állatorvosi kezelés szükséges.

Költségek

A masztitisz minden évben több pénzt emészt fel, mint bármilyen más betegség. A szubklinikai masztitiszból adódó veszteségek is - elsősorban a rosszabb minőségű tej miatt jelentősek. A betegség elleni legjobb védekezés a kórokozók megfékezése.

Védekezés

A masztitisz megelőzésének leghatásosabb módszere közvetlenül fejés után a tőgybimbó fertőtlenítése. Ekkor a legfogékonyabb a tőgy a fertőzésre.

Számos vizsgálat azt mutatja, hogy 50-90%-kal csökken az újonnan fertőzött tehenek száma, ha tőgyfertőtlenítést alkalmazunk.

Természetesen a tőgyfertőtlenítő szernek el kell pusztítania a baktériumokat, de fontos, hogy a tőgy bőrét is puhítsa. Ez a kezelés növeli a tőgy rugalmasságát.

A fejés és tőgyfertőtlenítés befejezése után használhatunk tőgykenőcsöt, amely tovább javítja a tőgy bőrének állapotát.

DeLaval fejési és higiéniai munkamenet

A tőgybimbót fejés előtt le kell tisztítani és szárazra törölni, ezzel megakadályozható, hogy piszok és baktérium kerüljön a hűtőtartályba.

Használjon nedves tőgytörölőt, amely hatékonyan tisztít és stimulálja a tőgyet. A stimulált tőgyből a tej könnyen kifejhető. Így könnyű és gyors lesz a fejés, magas lesz a tejhozam. A bimbófürösztt csészével/spray-vel történő fertőtlenítés - megfelelő általános higiéniaival párosítva - csökkenti a masztitisz előfordulási gyakoriságát.



1. Mossa meg kezét!




2. Fejjen ki egy kevés tejet az előfejtő csészébe és vizsgálja meg!
A tej csomósodása a klinikai masztitisz jele lehet, s ilyen esetben állatorvost kell hívni.

Ne az alomra fejje ki a tejsugarakat! Az első tejsugarakban található a legtöbb baktérium, s a beteg tőgynegyedekről a fertőzés átterjedhet az egészséges tőgynegyedekre és más tehenek tőgyére.



3. Törölje le a tőgyet nedves DeLaval tőgykendővel!

Minden tehénnél új tőgykendőt használjon, hogy a baktériumok ne terjedjenek át egyik tehenről a másikra!



4. A megszokott módon fejjen!



5. Közvetlenül a fejés befejezése után fertőtlenítse a tőgybimbót! A masztitist okozó baktériumok bejuthatnak a bimbócsatornán keresztül a tőgybimbóba és a tőgybe. Ez fejés alatt történhet meg, amikor a bimbócsatorna nyitva van.



DeLaval tőgyfertőtlenítővel kezelje a tőgyet; így a tőgybimbóban lévő baktériumok elpusztulnak és nem jutnak a bimbócsatornába.